



**ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR EN
CENTROEUROPA**
(24/02/2020)

Desde el día 31 de diciembre del 2019 hasta el 24 de febrero de 2020 han sido notificados un total de 46 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en países de Centroeuropa: 27 focos en aves de corral y 1 foco en aves silvestres en Polonia, 3 focos en aves de corral y 1 focos en aves cautivas en Eslovaquia, 4 focos en aves de corral en Hungría, 2 focos en aves de corral en Rumanía, 2 focos en aves de corral en República Checa, 1 foco en aves de corral en Ucrania, 3 foco en aves de corral en Bulgaria y 1 foco en aves de corral y 1 foco en aves silvestres en Alemania.

Paralelamente, Dinamarca ha notificado 1 foco de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) en aves de corral subtipo H5N1.

En la siguiente tabla se muestra detalle de los focos declarados en ADNS hasta el 24/02/2020.

País	Fecha	Nº de focos	Subtipo	Especie afectada
Polonia	31/12	3	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	02/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pintadas
	03/01	3	Alta Patogenicidad - H5N8	Gallinas ponedoras 2 en traspatio (ponedoras, gansos, palomas y patos)
	04/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	05/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	07/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Halcón (silvestres)
	10/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	13/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Gansos reproductores (comercial) y traspatio (ponedoras)
	15/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos reproductores



	16/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos de engorde
	18/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Traspatio (ponedoras, broilers, ocas, patos, palomas, loros)
	23/01	3	Alta Patogenicidad - H5Nx	Pavos y traspatio
	26/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	29/01	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos y traspatio (ponedoras)
	08/02	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	21/02	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos
	22/02	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos
	23/02	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos
Eslovaquia	09/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Traspatio (ponedoras)
	17/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Traspatio (ponedoras)
	24/01	1	Alta Patogenicidad – H5N8	Aves cautivas (zoo)
	26/01	1	Alta Patogenicidad – H5N8	Traspatio
Hungría	12/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos
	14/01	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos y Pavos de engorde
	17/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Pavos de engorde
Rumanía	14/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Ponedoras
	17/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Ponedoras
República Checa	17/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Aves de corral
	16/02	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Aves de corral
Ucrania	19/01	1	Alta Patogenicidad - H5Nx	Aves de corral
Alemania	19/01	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Focha común (silvestres)
	07/02	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Traspatio (ponedoras, patos, gansos)
Bulgaria	17/02	1	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos
	24/02	2	Alta Patogenicidad - H5N8	Patos
Dinamarca	29/01	1	Baja Patogenicidad - H5N1	Ponedoras ecológicas

x: Subtipo desconocido

Hasta el momento se han visto afectadas por el brote de IAAP explotaciones de aves de corral en 8 países de la región, que incluyen explotaciones comerciales de pavos, ocas, gansos, patos, ponedoras, codornices y explotaciones de traspatio. Igualmente, se han detectado dos focos en aves



las aves de corral en países como es el caso de España, que puede pasar de ser país de paso de aves migratorias a ser país de destino de poblaciones de aves silvestres que tendían a migrar tradicionalmente al continente africano. El contacto entre aves silvestres y domésticas es muy probable si no se garantiza una separación física adecuada entre ambas poblaciones a través de la aplicación de correctas medidas de bioseguridad.

Ante la detección de los focos en aves domésticas, los Estados Miembros están aplicando las medidas previstas en la Directiva 2005/94/EC para garantizar el rápido y efectivo control de los focos declarados, entre ellas el sacrificio de todas las aves de las explotaciones afectadas y el establecimiento de las respectivas zonas de protección y de vigilancia alrededor de los focos, con restricción de movimiento de aves y de sus productos. Por su parte, la detección del subtipo H5N8 del virus de la IAAP en aves silvestres no implica adoptar medidas de restricción de movimientos de aves y de sus productos.

Por otro lado, el MAPA ha confirmado que no existen movimientos de riesgo de aves vivas desde las explotaciones afectadas con destino España.

Finalmente, hay que señalar que no se ha detectado ningún caso de transmisión a humano causado por este subtipo hasta el momento, siendo considerada una cepa de reducido potencial zoonótico.

Dada la actual situación de circulación expansiva del subtipo H5N8 en Centroeuropa, desde el MAPA se recuerda la necesidad de **reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas**, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como **reforzar la vigilancia pasiva** tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata. Además, se debe **incrementar la sensibilización de ganaderos, veterinarios de explotación, cazadores y toda la población en general sobre la influenza aviar altamente patógena, las medidas de precaución y los mecanismos de notificación de aves enfermas o muertas**.

Toda la información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/influenza-aviar/influenza_aviar.aspx



Para información sobre la enfermedad en aves silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas consultar la **guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre** en su apartado dedicado a la IA:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF